

الوثائق الصحية المطلوبة للدخول للمدارس

تتطلب المدارس العامة بأرلينغتون (APS) وولاية فرجينيا من الطلاب الداخلين إلى المدرسة لأول مره ضرورة لتقديم الوثائق الصحية التالية:

1. **الفحص الطبي البدني:** http://apsva.us/wp-content/uploads/2015/02/school_entrance_form.pdf

الفحص الطبي البدني (يجب أن يتم قبل عام واحد من دخول المدرسة) وهو مطلوب لجميع الطلاب الجدد الذين يدخلون مرحله ما قبل المدرسة وحتى الصف الخامس. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الفحص الطبي البدني الجديد مطلوب لجميع طلاب رياض الأطفال، حتى لو كان الطالب سبق وأن قدم وثيقة فحص سابقة عند الدخول إلى برنامج المدارس العامة بأرلينغتون APS

2. فحص السل:

توثيق للتقييم السلبي لمخاطر السل

(<https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/TB-Risk-Assessment-for-Students-Updated-2.18.pdf>)

أنتائج فحص السل (الجلد أو الدم) التي تمت في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة قبل الدخول للمدرسة وهي مطلوبة لدخول جميع الطلاب الجدد لمدارس إرلينغتون APS وإذا كان اختبار فحص السل إيجابياً، فإنه يلزم إجراء تقييم للاعراض قبل الدخول ويلزم إجراء أشعة سينية على الصدر في غضون 21 يوماً بعد البدء في الدراسة. يجب علي الطلاب المسجلين سابقاً في لمدارس إرلينغتون APS كمرحلة ما قبل المدرسة ان يكون لديهم تقييم سلبي لمخاطر السل أو اختبار للكشف عن السل في موعد لا يتجاوز سنة واحدة قبل اليوم الأول من دخولهم لروضة الأطفال. **3. التطعيم:**

هناك العديد من التطعيمات المطلوبة لدخول المدرسة. وترد أدناه متطلبات التطعيم العامة. لمزيد من التفاصيل المحددة حول هذه المتطلبات، يرجى الرجوع إلى هذا الموقع <http://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/>

أ. **الخنق، الكزاز، والسعال الديكي** على الأقل أربع جرعات من التطعيم أو الداعم (DTaP) السعال الديكي (مع جرعة واحدة عند/بعد عيد الميلاد الرابع (4) أو الداعم 3 Tds (الكزاز/الخنق) إذا كان عمر الطفل 7 سنوات أو أكثر. مطلوب الداعم Tdp لجميع الطلاب الذين بلغوا 11 سنة من العمر.

ب. **لقاح شلل الحمام** – ما لا يقل عن 4 جرعات. يجب ان تدار جرعه واحده في أو بعد عيد الميلاد الرابع .
ت. **لقاح التهاب الكبد الوبائي – B** سلسلة كاملة من 3 جرعات من لقاح التهاب الكبد B مطلوبه لجميع الطلاب. ملاحظه-وافقت "إدارة الاغذية والعقاقير" FDA علي جدول مكون من جرعتين (2) فقط للمراهقين البالغين 11-15 سنة من العمر فقط عندما يتم استخدام العلامة التجارية ميرك (RECOMBIVAX HB) تركيبه البالغين ضد التهاب الكبد B اللقاح. إذا تم استخدام جدول الجرعتين (2) للمراهقين 11-15 سنة من العمر فإنه يجب ان تكون موثقه بوضوح في نموذج المدرسة.

ث. **لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الحميرية** – بحد ادني جرعتين. ويحصل معظم الطلاب علي اللقاح المركب لمرض الحصبة النفاسية-ومع ذلك ، إذا كانت اللقاحات تدار بشكل فردي ، فإنه يلزم الحد الأدنى من التطعيم مرتين (2) ضد الحصبة، وجرعتين اثنتين (2) ضد النكاف، وجرعة واحدة (1) ضد الحميراء. ويجب ان تدار الجرعة الاولى لكل مكون (أو اللقاح المركب لمعدل وفيات الأمهات) في سن 12 شهرا أو أكثر والجرعة الثانية قبل دخول رياض الأطفال.

ج. **لقاح الحمق (الجديري)** – جرعتين (2) كحد ادني. يجب ان تعطى الجرعة الاولى في سن 12 شهرا أو أكثر والجرعة الثانية قبل دخول رياض الأطفال. (استثناء – مطلوب جرعه واحده فقط للطلاب الذين دخلوا روضه الأطفال قبل 3 مارس 2010) .
ح. **لقاح فيروس الورم الحليمي البشري** – يوصي بالتطعيم الروتيني في سن 11 – 12 لكل من الفتيات والفتيان من قبل "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" (CDC) يوصي بجرعتين (2) للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة؛ وثلاث (3) جرعات إذا كان العمر 15 سنة أو أكبر. ويطلب من الفتيات اللاتي يدخلن الصف السادس ان يحصلن علي الأقل علي الجرعة الاولى من هذه السلسلة، ولكن يجوز للوالدين ان يختارا الرفض دون التعرض للعقوبة.

خ. **لقاح النزلة النزفية من النوع ب (التطعيم)**-هذا اللقاح مطلوب فقط للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 60 شهرا. عدد الجرعات المطلوبة يعتمد علي العمر عند تلقي الجرعة الاولى.

د. **المكورات الرئوية (PCV) اللقاح** – هذا اللقاح مطلوب فقط للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 60 شهراً. وتتراوح الجرعات المطلوبة ما بين جرعة واحدة (1) إلى أربع (4) جرعات، اعتمادا علي العمر عند إعطاء الجرعة الاولى.

للحصول علي استمارات الدخول الصحية، يرجى الرجوع إلى هذا الموقع: <https://www.apsva.us/registering-your-student> أو مراجعة المسجل الخاص بالمدرسة أو موظفي العيادة.